Ocaren 57EC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Profenofós: 500 g/L (50.0%)
Fipronil: 70 g/L (7.0%)

Nombre Químico
Profenofós: (RS)-(O-4-bromo-2-chlorophenyl O-ethyl S-propylphosphorothioate)
Fipronil: (RS)-5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl) phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile

No. CAS
Profenofós: 41198-08-7
Fipronil: 120068-37-3

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable EC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Ligeramente amarillo
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

Ocaren 57EC es un insecticida de amplio espectro, con acción por contacto e ingestión. Posee rápido poder de penetración en el tejido de la planta con actividad translaminar y acción sistémica en especial cuando se utilizar en tratamiento al suelo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Ocaren 57EC la acción tóxica es por su antagonismo del ácido gamma-amino butírico (GABA), el cual es un neurotransmisor ampliamente distribuido en las neuronas del córtex cerebral. Inhibe en el sistema nervioso la acción de la enzima acetilcolinesterasa, provocando disturbios en el insecto hasta ocasionarle la muerte.

RECOMENDACIONES DE USO

Ocaren 57EC se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados previamente.

MODO DE APLICACIÓN

Diluir el producto en la cantidad de agua que se utilizará en la aspersión, agitar la mezcla. El producto puede ser aplicado con equipos de aspersión terrestre en alto o bajo volumen. No aplicar el producto cuando esté por llover.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
CAFÉ ***Coffea arabica***	Broca ***Hypothenemus Hampei***	0.4 -0.6 L/ha
TOMATE ***Solanum Lycopersicum*** PAPA ***Solanum Tuberosum***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Tortuguilla ***Diabrotica* sp** Parathrioza ***Bactericera cockerelli)***	200 -250 ml/200L
CEBOLLA ***Allium cepa***	Thrips ***Thrips tabaci***	200 -250 ml/200L
PIMIENTO ***Capsicum annuum*** JALAPEÑO ***Capsicum Frutescens***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Picudo del chile ***Anthonomus eugenii***	200 -250 ml/200L
ARROZ ***Oryza sativa***	Ácaro blanco ***Steneotarsonemus spinki***	300 ml/ha
CAMOTE ***Ipomoea batata***	Gallina ciega ***Phyllophaga* spp.** Gusano Alambre ***Agriotes* sp**	0.3 -0.4 L/Ha
MAÍZ ***Zea mays*** SORGO ***Sorghum bicolor***	Cogollero ***Spodoptera* sp.** Áfido amarillo ***Melanaphis sacchari***	200 -250 ml/ha
REPOLLO ***Brassica sp.***	***Plutella xylostella***	200 -250 ml/200L
MELÓN ***Cucumis melo*** PEPINO ***Cucumis sativus*** SANDÍA ***Citrullus lanatus*** CALABAZA ***Cucurbita moschata***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	200 -250 ml/200L

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

Ocaren 57EC

OKRA ***Abelmoschus esculentus*** BERENJENA ***Solanum melongena*** VEGETALES ORIENTALES	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	200 -250 ml/200L
FRIJOL ***Phaseolus Vulgaris***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Picudo de la vaina ***Chalcodermus angulicollis***	150-200 ml/200 L
CAÑA DE AZÚCAR **Saccharum officinarum**	Salivaso ***Aenolamia* spp.**	0.4-0.6 L/ha

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

!
ATENCIÓN

PRESENTACIONES

50 ml, 60 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml
1L, 4L, 5L, 10L, 20L, 50 L, 200 L

REGISTRO

Honduras: 1431-681-III

Formulador:
Jiangsu Baoling Chemical Co. LTD.
Nantong, Jiangsu – China

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER