Suckercide 12,5 EC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Flumetralin: 12,5 %m/v

Nombre Químico
Flumetralin: N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-ethyl-α, α, α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine (IUPAC)

No. CAS
Flumetralin: 62924-70-3

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Amarillo a naranja
Densidad: 0,99 g/mL a 25°C
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Inflamabilidad: Inflamable.
Explosividad: No es explosivo

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

SUCKERCIDE 12,5 EC es un regulador de crecimiento de plantas, sistémico, absorbido en las axilas de las hojas de tabaco. Se aplica antes o después de que la planta ha alcanzado el máximo crecimiento apical (topping), provee un control prolongado de los chupones (hasta 9 o 10 semanas después del tratamiento).

Provee control total de los chupones sin ocasionar blanqueamiento o bronceado de las hojas. Permite a las hojas continuar con su desarrollo después de la aplicación para obtener un cultivo sano y un aumento de peso adicional de la cosecha..

RECOMENDACIONES DE USO

Suckercide 12,5 EC es un regulador de crecimiento de plantas, sistémico, absorbido en las axilas de las hojas de tabaco. Provee control total de los chupones sin ocasionar blanqueamiento bronceado de las hojas. Permite a las hojas continuar con su desarrollo después de la aplicación para obtener un cultivo sano y un aumento de peso adicional de la cosecha.

Se recomienda hacer una aplicación manual de la solución, empleando botellas dosificadoras que permitan aplicar sobre el cogollo de la planta un volumen de 12-15 ml.

MODO DE APLICACIÓN

Realice pre mezcla agregando la dosis recomendada de **SUCKERCIDE 12,5 EC**; en una cubeta con agua. Vierta este contenido en el tanque con el total a utilizar y mezcle. Utilice equipo auxiliar como dosificadores, paletas de agitación, cubetas.
El equipo usado después de la aplicación de ser lavado adecuadamente.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	USO	DOSIS
TABACO *Nicotiana tabacum*	Control de brotes, chupones y yemas auxiliares	6 mL/L. La aplicación se hace en post desbotonado o hasta 3 días después. Se recomienda aplicar un volumen de solución por planta de 12-15 ml.

PERÍODO DE CARENCIA: No aplica.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

1 L; 3,785 L; 10 L, 20 L

REGISTRO

Honduras: 1724-1134-I

Formulador:
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
Xinanjiang, Jiande City Zhejiang Province, China

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste Oficentro Milano Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
www.interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación