Acrux 32,87EC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Difenoconazole 250 g/l (25%)
Pyraclostrobin 78.7 g/l (7.87%)

Nombre Químico
Difenoconazole: cistrans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- 1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
Pyraclostrobin: Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl}(N-methoxy)carbamate

No. CAS
Difenoconazole 119446-68-3
Pyraclostrobin 175013-18-0

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Densidad: 1.0374 g/cm^3
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

MODO DE ACCIÓN

Acrux 32,87EC fungicida protectante y curativo. Absorbido por hojas con translocación translaminar y movimiento acropetal. Inhibe la demetilación del esterol y biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo. Inhibe respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar con equipo manual de espalda, motorizado o con terrestre acoplado al tractor. Los equipos deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto del agua y agitar hasta que la mezcla sea homogénea.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
OKRA ***Abelmoschus esculentus***	Moho blanco ***Sclerotinia rolfsii*** Antracnosis ***Colletotrichum* spp.**	0.25-0.5 L/Ha
CHIVE ***Allium schoenosprasum***	Roya ***Puccinia porri*** ***Puccinia allí***	
CAFÉ ***Coffea arabica***	Roya ***Hemileia vastratix***	0.5 a 0.75 L/ha
TOMATE ***Lycopersicum esculentum***	Alternaria ***Alternaria solani***	0.25-0.5L/ 200L de agua
PAPA ***Solanum tuberosum***		
ARROZ ***Oryza sativa***	Complejo manchado del grano ***Alternaria padwicki*** Añublo de la vaina ***Rhizotocnia solani***	0.75-1.0L/ha
CEBOLLA ***Allium cepa***	Alternaria ***Alternaria* sp** Oidium ***Peronospora destructor***	0.25 a 0.5 L/ha
CHILE (pimiento dulce) ***Capsicum annum***	Alternaria ***Alternaria solani***	0.2 L / 200 L de agua
MAÍZ ***Zea mays***	Mancha de asfalto ***Phyllachora maydis***	0.20-0.25 L/ha
PEPINO ***Cucumis sativus***	Alternaria ***Alternaria* sp.**	0.25 a 0.5 L/ha
TABACO ***Nicotiana tabacum***	Moho azul del tabaco ***Peronospora destructor***	0.75-1.0L/ha
BANANO ***Musa* sp.**	Sigatoka negra ***Mycosphaerella fijiensis***	0.5-0.75 L/ha
FRIJOLES ***Phaseolus vulgaris***	Roya ***Uromycetes phaseoli*** Antracnosis ***Colletotrichum lindemuthiarum***	0.25 a 0.5 L/ha

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc@interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

Acrux 32,87EC

CÍTRICOS ***Citrus sinensis*** MAGO ***Magnifera indica*** AGUACATE ***Persea americana*** PAPAYA ***Carica papaya***	Antracnosis ***Colletotrichum* spp.**	0.5-1.0 L/ha

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml
1L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L

REGISTRO

Honduras: 694-523-II

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule, Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 - 4) 216 – 2608

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc@interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER